

Информированное согласие на проведение хирургического вмешательства

Я _____ проинформирован о необходимости хирургической операции, удаление зуба (нужное подчеркнуть) _____ понимаю цель ее проведения.

Я понимаю необходимость рентгенологического контроля качества лечения и обязуюсь приходить на контрольные осмотры (по графику согласованному с доктором и записанному в истории болезни).

Как вести себя после удаления зуба.

После прекращения действия анестетика возможно появление болевых ощущений. Для их устранения можно принять обезболивающие препараты (анальгин, темпалгин, баралгин, кетанов).

Тампон, наложенный на рану, рекомендуется удалить через 10 минут.

Если после удаления тампона кровотечение не остановилось в течение часа (допускаются скудные кровяные прожилки в слюне), то Вам необходимо обратиться к врачу в экстренном порядке.

Для того, чтобы не нарушать формирование сгустка, ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода полоскания в первый день. Через 2-3 суток необходимо прополоскать полость рта после приема пищи отваром ромашки, шалфея, содовым раствором.

Если на вторые-третьи сутки повышается температура тела, появляется ограничение открывания рта, сохраняются боли в лунке удаленного зуба или появляется отечность лица (если об этом Вы не были предупреждены заранее), необходимо обратиться к врачу повторно.

ПОМНИТЕ, если лунка не зажила за это время, то она нуждается в обязательном лечении у врача.

Если удаление зуба производилось в период обострения (боли, припухлость, повышенная температура, наличие гнойных выделений), то вероятность инфицирования лунки увеличивается, а также возможен переход заболевания в новую стадию с усилением всех выше перечисленных симптомов (увеличение отека, повышением температуры тела, ухудшением общего состояния). В этом случае посещение врача необходимо, и, возможно, потребуются дополнительные манипуляции (дренаж, кюретаж...), что повлечет дополнительную оплату.

Не рекомендуется в течение трех дней переохлаждаться, перегреваться, переносить большие физические нагрузки.

После удаления 26, 27, 28, 36, 37, 38, 16, 17, 18, 46, 47, 48 зубов возможно появление небольших трещин в уголках губ.

Если после удаления Вы ощущаете острые края на коронках соседних зубов, сообщите об этом врачу.

Пожалуйста, предварительно созвонитесь с администратором соответствующей клиники и сообщите о своем визите заранее, т.к. хирург может быть занят проведением плановых операций. Администратор запишет Вас на ближайшее время.

ФИО и подпись пациента _____

Подпись врача _____ Дата _____

Информированное согласие на проведение хирургического вмешательства

Я _____ проинформирован о необходимости хирургической операции, удаление зуба (нужное подчеркнуть) _____ понимаю цель ее проведения.

Я понимаю необходимость рентгенологического контроля качества лечения и обязуюсь приходить на контрольные осмотры (по графику согласованному с доктором и записанному в истории болезни).

Как вести себя после удаления зуба.

После прекращения действия анестетика возможно появление болевых ощущений. Для их устранения можно принять обезболивающие препараты (анальгин, темпалгин, баралгин, кетанов).

Тампон, наложенный на рану, рекомендуется удалить через 10 минут.

Если после удаления тампона кровотечение не остановилось в течение часа (допускаются скудные кровяные прожилки в слюне), то Вам необходимо обратиться к врачу в экстренном порядке.

Для того, чтобы не нарушать формирование сгустка, ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода полоскания в первый день. Через 2-3 суток необходимо прополоскать полость рта после приема пищи отваром ромашки, шалфея, содовым раствором.

Если на вторые-третьи сутки повышается температура тела, появляется ограничение открывания рта, сохраняются боли в лунке удаленного зуба или появляется отечность лица (если об этом Вы не были предупреждены заранее), необходимо обратиться к врачу повторно.

ПОМНИТЕ, если лунка не зажила за это время, то она нуждается в обязательном лечении у врача.

Если удаление зуба производилось в период обострения (боли, припухлость, повышенная температура, наличие гнойных выделений), то вероятность инфицирования лунки увеличивается, а также возможен переход заболевания в новую стадию с усилением всех выше перечисленных симптомов (увеличение отека, повышением температуры тела, ухудшением общего состояния). В этом случае посещение врача необходимо, и, возможно, потребуются дополнительные манипуляции (дренаж, кюретаж...), что повлечет дополнительную оплату.

Не рекомендуется в течение трех дней переохлаждаться, перегреваться, переносить большие физические нагрузки.

После удаления 26, 27, 28, 36, 37, 38, 16, 17, 18, 46, 47, 48 зубов возможно появление небольших трещин в уголках губ.

Если после удаления Вы ощущаете острые края на коронках соседних зубов, сообщите об этом врачу.

Пожалуйста, предварительно созвонитесь с администратором соответствующей клиники и сообщите о своем визите заранее, т.к. хирург может быть занят проведением плановых операций. Администратор запишет Вас на ближайшее время.

ФИО и подпись пациента _____

Подпись врача _____ Дата _____